ESPECTORANTES



ESPECTODROG 1

PRÓXIMO LANZAMIENTO

1 L | 5 L

COMPOSICIÓN: Bromhexina 2.5 g Guaifenesina 10 g Eucaliptol 50 g Vehículo c.s.p. 1000 ml

INDICACIONES: Se indica en bovinos, porcinos, aves y equinos, sólo o en combinación con antibióticos, contra enfermedades o síndromes respiratorios en los que el daño del aparato mucociliar degenere en la producción excesiva de moco viscoso. La tos crónica en equinos, bronconeumonía en bovinos y la bronquitis crónica en perros son algunos ejemplos que motivan su prescripción médica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Aves (en agua de bebida): 0.5 ml por litro de agua, durante 3 a 5 días.
Bovinos y equinos (vía oral directa): 20 a 25 ml por animal/día, durante 3 a 5 días.
Becerros y potros (vía oral directa): 6 a 7.5 ml por animal/día, durante 3 a 5 días.
Porcinos (vía oral directa): 10 ml por animal/día, durante 3 a 5 días.
Nebulización: Usar 500 ml por mochila de agua de 20 litros durante 3 a 5 días (a criterio del Médico Veterinario).



ESPECTODROG N

1 L | 5 L | 20 L

COMPOSICIÓN: Bromhexina HCl 5 g, Guaifenesina 30 g, Eucaliptol 80 g, Ácido acético 50 g, Vehículo c.s.p. 1000 ml.

INDICACIONES: Indicado para el tratamiento de síndromes respiratorios, solo o como coadyuvante de terapia antibiótica.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Aves, bovinos, equinos, porcinos: En todas las etapas productivas.
Caninos y felinos: A partir de 3 semanas de edad.
Nebulización: Usar 250 a 500 mL / mochila de agua de 20 L durante 3 a 5 días a criterio del Médico Veterinario.
Agua de bebida:
- Aves: 0.25 a 0.5 mL / L de agua, por 3 a 5 días.

Vía oral en toma directa:
- Bovinos, equinos: 20 a 25 mL / animal / día por 3 a 5 días.
- Becerros y potros: 6 a 7.5 mL / animal / día por 3 a 5 días.
- Porcinos: 10 mL / animal / día por 3 a 5 días.
- Caninos: 2 a 4 mL / animal / día por 3 a 5 días.
- Felinos: 0.5 mL / animal / día por 3 a 5 días.

VITAMINAS



AMINOVITASOL LÍQUIDO

5 L

COMPOSICIÓN: Vitamina B1 HCL: 500 mg, B2: 50 mg, B6 HCL: 300 mg, Cianocobalamina: 2000 mcg, Pantoténico de Ca: 1000 mg, Cloruro de Colina: 2000 mg, DL Metionina: 1000 mg, Lisina HCL: 800 mg, Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES: Mejorador de la conversión alimenticia. Prevención y tratamiento de los estados de Stress producidos por vacunaciones.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Solución oral en agua de bebida.
En aves, vacunos, ovinos, cerdos, caprinos, equinos y conejos: **Preventivo:** 1/2 a 1 ml por lt. en agua de bebida. **Curativo:** 2 a 3 ml por lt. Durante 3 a 7 días. Tomas individuales 1 ml cada 10 K.p.v.



CHEMI STRESS RC

SOLUCIÓN ORAL

1 L | 5 L

COMPOSICIÓN: Vitamina B1: 8 g, Vitamina B2: 16 g, Vitamina B6: 11.6 g, Vitamina B12: 0.02 g, Vitamina C: 5 g, Vitamina D3: 5 g, Vitamina K3: 1 g, Niacina: 10 g, Ácido fólico: 2.8 g, Biotina: 0.3 g, Pantotenato de calcio: 47 g, Cloruro de sodio: 217 g, Cloruro de potasio: 34 g, Sulfato de magnesio: 7 g. Excipiente soluble c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Prevención y tratamiento de deficiencias vitamínicas y desequilibrios electrolíticos en aves y porcinos. Indicado en trastornos digestivos, respiratorios, intoxicaciones, reacciones post vacunales, parálisis de los dedos, emplume deficiente, retardo del crecimiento, dermatitis escamosa de las patas, debilidad y estrés por enfermedades bacterianas, víricas o parasitarias. Aumenta la producción de huevos y mejora la fertilidad e incubabilidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en agua de bebida. **Aves y porcinos:** 100 mL de CHEMI STRESS RC Solución Oral por cada 200 litros de agua durante no menos de 4 días. **En pollos bebé o estadios jóvenes de aves:** 100 mL por 200 litros de agua a la recepción durante 5 días continuos.



CHEMI STRESS

SOLUCIÓN ORAL

PRÓXIMO LANZAMIENTO

1 L | 5 L

COMPOSICIÓN: Vitamina B1: 8 g, Vitamina B2: 10 g, Vitamina B6: 10 g, Vitamina B12: 0.015 g, Ácido fólico: 1.8 g, Pantotenato de calcio: 5 g, Cloruro de colina: 6 g, Cloruro de sodio: 80 g, Cloruro de potasio: 34 g, Sulfato de magnesio: 7 g. Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Terapia de soporte en aves frente a cuadros de estrés (calor, transporte, manejo, vacunación o cambio de alimento).

Indicado en intoxicaciones alimentarias o medicamentosas, hígado graso, deshidratación, retardo del crecimiento, dermatitis y emplume deficiente.
Coadyuvante en la convalecencia de patologías infecciosas y parasitarias; estimula el apetito, optimiza la conversión alimenticia y favorece la fertilidad, incubabilidad y producción de huevo.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el agua de bebida. **Aves (pollos, gallinas, pavos, patos y codornices):** 0.5 mL por litro de agua constante durante un período no menor a 4 días o según criterio del Médico Veterinario.

ANTIPIRETICOS



ANTITERMICO COMPUESTO FAEVE

25 KG

COMPOSICIÓN: Ácido Acetilsalicílico 23 gm. Cafeína 2,5 g Sulfato de Na 9 g, Sulfato de K 8 g, Dextrosa 15 g. Colorante R.P.B. 0,05 g. Excipiente c.s.p. 100 g.

INDICACIONES: En enfermedades tóxicas ó infecciosas; que cursen con hipertermia, golpe de calor, aumento de temperatura corporal por reacciones postvacunales.
ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Solución oral en agua de bebida.
Para aves, bovinos, equinos, porcinos, ovinos y conejos.
Dosis terapéutica: en agua de bebida 1/2 a 1 g por Lt, en el alimento 2 a 3 g por Kg.
Dosis profiláctica: En agua de bebida 1/8 a 1/4 g por lt. En el alimento 1/2 a 1 g por Kg.
En tomas individuales para Equinos, Bovinos y Porcinos, 1 g cada 15 a 30 Kg. de peso vivo.

COCCIDICIDA

COMPOSICIÓN: Toltrazuril 25 g, Vitamina 3 g (Vitamina K3), Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Tratamiento y control de coccidiosis en aves, bovinos, ovinos, caprinos y porcinos causadas por Eimeria spp. y Cystoisospora suis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Aves: Vía oral, en el agua de bebida.
Aves (pollos de engorde, pavos y reproductoras): 1 mL de TOTRAL K / L de agua por 2 días, o 3 mL de TOTRAL K / L cada 8 hoas por 2 días consecutivos.
Bovinos: 6 mL de TOTRAL K / L de agua a criterio del Médico Veterinario.
Ovinos, caprinos y porcinos: 8 mL de TOTRAL K / L de agua a criterio del Médico Veterinario.



PRÓXIMO LANZAMIENTO

TOTRAL K

1 L

INYECTABLES



DOXIDROG

500 mL

COMPOSICIÓN: Doxiciclina 10 g, Vehículo c.s.p. 100 mL

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento de procesos respiratorios como: neumonías, bronconeumonías y/o pleuroneumonias.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Solo vía intramuscular.
Bovinos: 1 mL de DOXIDROG INY / 10 kg p.v. / día, durante 3.
Ovinos, caprinos y porcinos: 0.5 mL de DOXIDROG INY/10 kg p.v./día, durante 4–5 días.



GATIFLOXADROG INY

50 mL | 100 mL | 250 mL | 500 mL

COMPOSICIÓN: Gatifloxacina 8 g, Vehículo c.s.p. 100 mL.

INDICACIONES: Para el tratamiento de micoplasmosis, E.R.C., sinusitis, neumonías, aerosaculitis, septicemias, coriza infecciosa, ORT, pasteurelosis, colibacilosis, cólera aviar, salmonelosis, estreptococosis, estafilococosis e infecciones urogenitales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía subcutánea. **Aves (pollos, pavos y patos):** 1 mL de GATIFLOXADROG INY / 15 kg p.v. por día, durante 3 días.



IVER DROG

50 mL | 100 mL | 250 mL | 500 mL

COMPOSICIÓN: Ivermectina 10 mg, Cianocobalamina 0.3 mcg, Vehículo estéril c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES: Para el control y tratamiento de parasitosis internas y externas en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y camélidos sudamericanos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Dosis única / vía SC. **Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos:** 1 mL de IVER DROG / 50 kg p.v. **Porcinos:** 1 mL de IVER DROG / 33 kg p.v. *En casos de sarna: repetir a los 10 o 14 días, a criterio del Médico Veterinario. Dosis mayores a 10 mL, dividir en dos puntos de aplicación. Parásitos externos: repetir tratamiento a los 21 días.



OXIKETADROG L.A.

50 mL | 100 mL | 250 mL | 500 mL

COMPOSICIÓN: Oxitetraciclina base 200 mg, Ketoprofeno 30 mg, Vehículos c.s.p 1 mL.

INDICACIONES: Prevención y tratamiento de procesos infecciosos con reacción inflamatoria, dolorosa y febril.
Bovinos: Bronconeumonía, fiebre del transporte, enteritis bacteriana, difteria, carbunco sintomático, actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis, mastitis, metritis, pedera, onfaloartritis, dermatofitosis, queratoconjuntivitis, heridas infectadas e infecciones bacterianas secundarias a enfermedades virales.
Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos: Neumonías, mastitis, carbunco sintomático, infecciones post-parto e infecciones bacterianas secundarias a enfermedades virales.
Porcinos: Neumonía, rinitis atrófica, enteritis bacteriana, leptospirosis, erisipela, onfaloartritis, síndrome MMA, heridas infectadas e infecciones bacterianas secundarias a enfermedades virales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía IM profunda o SC. Dosis única: 1 mL/10 kg p.v. por día.



VIGORDROG

50 mL | 100 mL | 250 mL | 500 mL

COMPOSICIÓN: Triptófano 2.5 mg, Histidina 5 mg, Metionina 10 mg, Lisina 10 mg, Ácido cítrico 5 mg, Tiamina clorhidrato 5 mg, Riboflavina 2 mg, Nicotinamida 50 mg, Vitamina B12 15 mcg, Piridoxina clorhidrato 10, mg Hierro (Citrato amoniacal) 20 mg, Cobalto 0.5 mg, Cacodilato de sodio 30 mg, Glicerofosfato de sodio 20 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES: Trastornos de la hematopoyesis, anemia, trastornos del metabolismo, convalecencia de enfermedades parasitarias e infecciosas, enflaquecimiento, debilidad, inapetencia, fracturas, intoxicaciones y agotamiento sexual. Estimulante del apetito, del crecimiento y la producción.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía IM profunda, SC o EV lenta. **Bovinos y equinos:** 10 - 20 mL / día. **Terneros y potrillos:** 5 - 10 mL / 4 - 5 días. **Ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos:** 5 mL / 2 días. **Corderos y cabritos:** 2 - 3 mL / 2 días. **Porcinos:** de 2 - 10 kg p.v.: 1 mL / 2 o 3 días; de 10 a 20 kg p.v.: 2 mL / 2 o 3 días; de 20 a 50 kg p.v.: 5 mL / 2 o 3 días; de 50 a 100 kg p.v.: 10 mL / 2 o 3 días. **Aves:** 1 - 2 mL/ ave.

AGROVIDA

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS



AGROVIDA BOLIVIA TELÉFONOS: 72148281 | 72148358

ACIDIFICANTE
Y PROMOTOR DE CRECIMIENTO

PRÓXIMO LANZAMIENTO



CITRIDROG P
1KG | 5KG | 20 KG

COMPOSICIÓN: Ácido acético 100 g, Ácido láctico 80 g, Ácido cítrico 60 g, Ácido ascórbico 50 g, Excipientes c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES: Promotor de crecimiento, sanitizante microbiano, antioxidante para alimentos, protector de vitaminas liposolubles y sanitizante de cama (20-25 g/m² cada 15 días).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el alimento para aves y porcinos. Como sanitizante, usar 1-2 kg/t en alimento peletizado o 2-3 kg/t en alimento en polvo. Como promotor de crecimiento, 500 g/t; para control de Salmonella, 1 kg/t.

ANTIBIÓTICOS



AGROSULFA
1 Kg

COMPOSICIÓN: Sulfamonometoxina sódica 200 Sulfaclorpiridazina 300 g Sulfadimidina sódica 300 g Trimetoprima 200 g

INDICACIONES: Aves (pollos, gallinas y pavos): Síndrome de cabeza hinchada, cólera aviar, tifosis aviar, E.R.C., coriza infecciosa, coccidiosis y colisepticemia.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral según corresponda.

Alimento: 30 - 40 mg de AGROSULFA / kg p.v. / día.
Agua de bebida: 100 g de AGROSULFA / 200 L de agua durante 5 días.



AZ-DROG
1 L y 5 L

COMPOSICIÓN: Azitromicina dihidrato 100 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Para el control y tratamiento de infecciones del tracto respiratorio y problemas digestivos sensibles a la azitromicina.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Aves (pollos de engorde): Vía oral en el agua de bebida: 1 mL/10 kg p.v. por día o 100 mg / kg p.v. / 3 - 5 días. Agua de bebida constante: 1 mL / L de agua por 3 - 5 días. Caninos y felinos: Tratamiento de infecciones de piel y tejidos blandos: 1 mL/10 – 20 kg p.v. / día toma directa, durante 3 a 5 días (la duración depende de la severidad de la enfermedad y del criterio del Médico Veterinario).



BRONCOX D SOLUCIÓN ORAL
1 L

COMPOSICIÓN: Tilosina tartrato 50 mg, Doxiciclina z200 mg, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Aves (pollos, gallinas y pavos): Infecciones por Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma sinoviae, Mycoplasma meleagridis; E.R.C., síndromes respiratorios, colibacilosis, colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, clostridiosis.
Porcinos: Neumonía enzoótica, Pasteurella multocida y Corynebacterium pyogenes; erisipelas causadas por Erysipelothrix rhusiopathiae; rinitis atrófica y disentería porcina. Artritis causada por Mycoplasma hyosynoviae y Staphylococcus spp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el agua de bebida. **Tratamiento:** 0.1 mL de BRONCOX D Solución Oral / kg p.v. por día, o 1 litro de BRONCOX D Solución Oral / 1000 litros de agua, durante 3 a 5 días. **Control de Micoplasma:** Se recomienda administrar la dosis tratamiento durante de 5 a 7 días por mes, a criterio del médico veterinario.



DOXIDROG C PLUS
1 KG

COMPOSICIÓN: Composición con Doxiciclina 200 g y Ciprofloxacina 200 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES: Indicado en el tratamiento de enfermedad respiratoria crónica, micoplasma, colibacilosis, sinovitis infecciosa, cresta azul, cólera aviar, colisepticemia, coriza contagiosa, pasteurelosis, pseudomoniasis, salmonelosis, infecciones por estafilococos y *Erysipelothrix* sp.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el agua de bebida. **Aves y porcinos:** 50 a 100 mg de DOXIDROG C-PLUS /kg p.v. / día, durante 3 a 5 días, o 1 kg de DOXIDROG C-PLUS / 1000 litros de agua constante, durante 3 a 5 días.



ENROFLYN 20%
1L

COMPOSICIÓN: Enrofloxacina 200 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL

INDICACIONES: Indicado en porcicultura y avicultura (pollos de engorde, pollitos, pollonas, patos y pavos) para el tratamiento y control de infecciones causadas por gérmenes como Mycoplasma spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Escherichia coli, Pseudomona spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Clostridium spp., Proteus spp., Salmonella spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Corynebacterium spp., Bacillus spp., Erysipelothrix spp., Fusobacterium spp., Klebsiella spp., Listeria spp., Moraxella spp., Serratia spp., Shigella spp., Yersinia spp. y Vibrio spp. Tratamiento de las infecciones causadas por bacterias gram positivas y negativas sensibles a la enrofloxacina en perros y gatos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el agua de bebida.
Aves: 1 mL de ENROFLYN 20% / 20 kg p.v., durante 3 a 5 días.
Porcinos: 0.5 mL de ENROFLYN 20% / 20 kg p.v., durante 3 a 5 días.
Perros y gatos: 0.1 mL de ENROFLYN 20% / 4 kg p.v..



FLORFENIDROG L
1 L

COMPOSICIÓN: Florfenicol 100 mg, Excipientes c.s.p. 1 mL.

INDICACIONES: Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos Gram positivos y Gram negativos, como *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Clostridium* spp. y *Micoplasma*.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el agua de bebida.
Aves: 0.2 mL de FLORFENIDROG-L / kg p.v., por día durante 2 a 4 días consecutivos. **Porcinos:** 0.2 mL de FLORFENIDROG-L / kg p.v. por día durante 5 días consecutivos.



FOSFOTILDROG
1 L

COMPOSICIÓN: Fosfomicina sódica 100 g, Tartrato de tilosina 50 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Aves: E.R.C., mycoplasmosis, síndromes respiratorios, colibacilosis septicémica, coriza infecciosa, síndrome de cabeza hinchada, onfalitis, cólera aviar, tifoidea aviar, artritis bacteriana.
Porcinos: Colibacilosis, salmonelosis, complejo respiratorio porcino, pleuroneumonía, neumonías, artritis bacteriana, erisipela, infecciones intestinales, cistitis, pielonefritis, metritis.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el agua de bebida.
Aves y Porcinos: 1 mL de FOSFOTILDROG / litro de agua el primer día y posteriormente 0.5 mL de FOSFOTILDROG / litro de agua o 0.1 mL de FOSFOTILDROG / kg p.v. por día, durante 3 a 5 días.



TRIMETOXIN
1 L

COMPOSICIÓN: Trimetoprim 4 g, Sulfametoxazol 20 g, Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES: Bactericida de amplio espectro, que actúa contra algunos protozoarios, bacterias Gram positivas y Gram negativas, de las enfermedades de los animales domésticos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Solución oral en agua de bebida. **Dosis:** Oral en agua de bebida o tomas individuales. **Aves:** 1 a 1,5 ml por litro de agua durante 3 a 5 días seguidos. **Terneros y cerdos:** 3 ml cada 50 kg.p.v., por día en una sola toma, durante 3 días.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS LANDING.AGROVIDABOLIVIA.COM

HEPATOPROTECTORES
/ PROTECTORES HEPÁTICOS



SILYDROG 40 1 KG

COMPOSICIÓN: Silimarina 400 g, Excipiente c.s.p. 1000 g.

INDICACIONES: Se recomienda en todas las especies para prevenir y/o disminuir el daño hepático causado por toxinas en alimentos, medicamentos, productos químicos y enfermedades bacterianas, fúngicas o virales.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el alimento. **Aves, porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, equinos, perros y gatos.** 0.125 kg de SILYDROG 40 / tonelada de alimento, hasta la desaparición de signos clínicos o por 7 a 10 días cada mes como protector hepático.



HEPATODROG S.O. PRÓXIMO LANZAMIENTO
1 L

COMPOSICIÓN: Extracto de silimarina 40 g. Extracto de alcachofa 25 g. Aceite esencial de limón 5 g. Vehículos c.s.p. 1000 ml

INDICACIONES: Previene y trata el daño hepático agudo o crónico causado por algunas toxinas en los alimentos, medicamentos, productos químicos, enfermedades de carácter bacteriana, fúngica o viral. Además, es efectivo en la prevención y tratamiento del hígado graso (lipidosis hepática) y coadyuvante en el tratamiento de parasitosis hepáticas.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Vía oral, en el agua de bebida. **Aves, porcinos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, conejos y cuyes: Prevención:** 0.5 ml de HEPATODROG S.O. / L de agua de bebida constante, **Tratamiento:** 1 ml de HEPATODROG S.O. / L de agua de bebida constante, según criterio del Médico Veterinario.

INMUNOMODULADORES
/ INMUNOESTIMULANTES



INMUNO E PRÓXIMO LANZAMIENTO
1 L

COMPOSICIÓN: Extracto de Echinacea purpurea 50 g Elderberry 50 g Vehículos c.s.p 1000 mL.

INDICACIONES: Prevención de infecciones crónicas o recurrentes de origen bacteriano, viral o fúngico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el agua de bebida. Aves, porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos sudamericanos, conejos, cuyes, caninos y felinos: 1 mL de INMUNO E / L de agua constante, 1 mL de INMUNO E /10 kg p.v./día, 1 mL de INMUNO E /kg p.v. /día, durante 7 a 14 días.



SANGROVIT
20 KG

COMPOSICIÓN: Formulación estandarizada de material seco, granulado y molido de la planta Papaveraceae Macleaya cordata y su extracto. Sustancias activas: alcaloides cuaternarios benzo[c]fenantridina (QBA) y protopina alcaloides (PA).

BENEFICIOS: Sangrovit es la solución de origen natural en la que usted puede confiar. Su efecto comprobado sobre el apetito y la digestión, especialmente de grasas y proteínas, suman un gran valor a la formulación y mejoran el desempeño de los animales.
Esta es la manera que Sangrovit agregue el poder digestivo natural al alimento de sus animales para obtener resultados comerciales incomparables.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Cerdas: 50-150 g/t. Aves: 50-150 g/t. Bovinos: 50-200 g/t. Pequeños Rumiantes: 150-200 g/t. Caballos: 150-300 g/t. Peces: 200-300 g/t.

NATURALES Y ADITIVOS



ACTIVE D PRÓXIMO LANZAMIENTO
20 KG

COMPOSICIÓN: Harina de forraje/harina verde, harina de trigo y subproducto de fermentación con Aspergillus niger. Vitamina D3 (Colecalciferol): 10.000IU/kg

INDICACIONES: Active D se puede utilizar en todas las etapas de la vida de los animales de producción, con mejoras significativas en la mineralización ósea y en la formación del cascarón de huevo.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Pollos de engorde Ponedoras Cerdos Peces y camarones Inclusión de 200 - 700 g/ton.



ARBOCEL BWW 40
17,5 kilos

COMPOSICIÓN: Celulosa 100%. Fibra dietética basada en celulosa directamente ligada para mantener la salud animal.

BENEFICIOS Y DOSIS: Digestibilidad (Control de volumen y consistencia de heces) con una inclusión de 1-3%. Salud dental con una inclusión de 3-4%. Control de bola de pelo con una inclusión de 3-4%. Control de peso con una inclusión de 3-4%.
El éxito de ARBOCEL BWW40 es la perfecta combinación de propiedades nutricionales y funcionales / tecnológicas que ayuda a producir alimentos para mascotas de la más alta calidad, de la manera más económica.



ARBOCEL RC FINE
20 kilos

COMPOSICIÓN: Concentrado de fibra cruda fibrilada lignocelulosa con un contenido de fibra cruda de más del 70%. 100% insoluble.

INDICACIONES: Favorece la salud intestinal al tener un efecto positivo sobre la microbiota, reduciendo el riesgo de estreñimiento y diarrea. Mejora la absorción y utilización de nutrientes. Mejora la productividad y la performance.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Cerdas Gestantes: 2% - 3% en la ración. Cerdas Periparto: 2% en la ración. Cerdas en Lactación: 0.8% - 1.5% en la ración. Lechones: 1% - 1.5% en la ración. Cerdos de Engorde: 1% en la ración. Aves: 0.8% - 1.5% en la ración. Mascotas: 1% - 2% en la ración.



EM-DROG
1 L

COMPOSICIÓN: Microorganismos eficaces 50 x 10^7 UFC, Silicatos fosilizados 20 g, Vehículo c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONESN: Probiótico. Control de moscas y otros insectos (larvas y adultos) en los residuos orgánicos. Control de la humedad y los malos olores de las camas (amoniaco).

BENEFICIOS: Reducción significativa del mal olor de las instalaciones, camas y excretas. Disminuye la presencia de moscas y otros insectos como *Alphitobius* sp. Proporciona una mejora sanitaria que se refleja en la salud general de las aves. Ayuda en la obtención de residuos orgánicos de excelente calidad, los cuales pueden ser usados directamente como abono. Puede ser usado en presencia de animales por ser 100% natural, atóxico, no corrosivo, no volátil, no inflamable y no requiere periodo de retiro.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Aves y porcinos: 0.5 mL de EM-DROG por litro de agua de bebida, según programa de la granja. **Instalaciones pecuarias (camas):** 1 L de EM-DROG en 20 L de agua para 250 m² de superficie.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS VETERINARIOS LANDING.AGROVIDABOLIVIA.COM



ENZYBAC
1KG a 20 KG

COMPOSICIÓN: *Bacillus* spp. (*Bacillus subtilis* y *licheniformis*) 5g Enzimas (Amilasa, proteasa, lipasa, xilanasa, pectinasa) 32.5 g (Excipiente c.s.p. 1000 g)

INDICACIONES: Probiótico, promotor de crecimiento, recupera y mantiene la integridad intestinal, optimiza la digestibilidad de los alimentos y mejora los parámetros productivos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en el alimento. **Aves, porcinos, bovinos, equinos, ovinos y caprinos:** 0.5 a 1 kg de ENZYBAC / T de alimento, por 7 a 14 días o en forma continua según criterio del Médico Veterinario responsable.



ENZYBAC S.O. PRÓXIMO LANZAMIENTO
1L

COMPOSICIÓN: *Bacillus* spp. (*Bacillus subtilis* y *licheniformis*) 5 g Enzimas (Amilosa, proteasa, lipasa, xilanasa, pectinasa) 32.5 g (Excipiente c.s.p.
1000 g

INDICACIONES: Probiótico, promotor de crecimiento, recupera y mantiene la integridad intestinal, optimiza la digestibilidad de los alimentos y mejora los parámetros productivos.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Vía oral en agua de bebida. **Aves, porcinos, bovinos, equinos, ovinos y caprinos:** 0.25 a 0.5 mL de ENZYBAC Solución Oral. / litro de agua de bebida constante, por 7 a 14 días según criterio del Médico Veterinario responsable.



TALCOVID PRÓXIMO LANZAMIENTO
20 KG

COMPOSICIÓN: Fibras de lignocelulosa suaves y finas con absorción de agua superior al 800% 8 g H2O).

INDICACIONES : Suave con la piel, higiénico, natural, sin aditivos y sin residuos. Efecto vitalizador y mejorador de la circulación sanguínea. Remueve fluidos amnióticos mejorando la respiración y previniendo la caída de temperatura corporal. Favorece un mayor y mejor consumo de calostro. Seca al lechón en aproximadamente 20 segundos mediante masaje, liberando el tracto respiratorio y disminuyendo la mortalidad.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Uso tópico directo aplicado mediante masaje sobre el recién nacido según las indicaciones.

DESINFECTANTES



BENZALCON FORTE
5 L

COMPOSICIÓN: Cloruro de Benzalconio 50 g, Excipientes c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES: Propiedades bactericidas, germicidas, fungicidas, algicidas y desodorantes. Uso en frigoríficos, industria avícola, industria lechera, fábricas de conserva, ganadería, instrumental quirúrgico, etc.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Agua de bebida: 1 L en 5.000 - 10.000 L de agua. Comederos y bebederos: 1 L en 1.500 - 2.500 L de agua. Incubadoras, nacedoras, bandejas: 1 L en 1.500 L de agua. Pulverizaciones y nebulizaciones: 1 L en 2.500 - 3.000 L de agua. Ganadería en general: 1 L en 2.500 - 5.000 L de agua. Frigoríficos, mataderos e industria lechera: Máquinas de ordeñe, tarros, enfriadores, tanques de agua.



DROYOVET PRÓXIMO LANZAMIENTO
5 L

COMPOSICIÓN: Yodopovidona 10%; Ácido cítrico 9.6%; Fosfato disódico 2.68 %, Ácido fosfórico al 0.9 %.

INDICACIONES: Está indicado para la limpieza, desinfección y desodorización profunda de instalaciones pecuarias y ambientes abiertos o cerrados (con o sin presencia de animales) sometidos a alta carga microbiológica. Posee acción biocida frente a bacterias grampositivas, gramnegativas, protozoarios, levaduras, hongos, esporas y virus, siendo además apto para procesos de termofumigación.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Se aplica diluido en agua según el objetivo higiénico-sanitario:
Potabilización de agua de bebida: 100 mL en 200 L de agua.
Desinfección de hospitales veterinarios y recintos afines: 600 a 666 mL en 200 L de agua.
Galpones, plantas pecuarias, ganadería, industria avícola, pesquera y lechera: 625 mL en 200 L de agua.
Uso tópico (heridas o cortes en lechones y gorrinos): 10 mL por litro de agua.



GLUTALTEK 1/3
5L - 20 L

COMPOSICIÓN: Glutaraldehído 100 mL, Amonio Cuaternario 300 mL, Ácido Fosfórico 9 mL, Agua desionizada c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Recomendado en la desinfección de: Equipos e instalaciones pecuarias, pediluvios como tapete sanitario, plantas de incubación, vehículos de transporte de agua, alimento, aves. Jaulas de venta de pollos, granja después de final de campaña (saca de pollos).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Diluir 400 mL de GLUTALTEK 1/3 en 200 L de agua. Aplicar por aspersión o inmersión (pediluvios) y dejar actuar 5 minutos.



GLUTALTEK 2/3
1L - 5L - 20 L

COMPOSICIÓN: Glutaraldehído 200 mL, Amonio Cuaternario 300 mL, Solvente especial c.s.p. 1000 mL.

INDICACIONES: Desinfección de equipos pecuarios, pediluvios, desinfección de huevos incubables, salas de ordeño, vehículos de transporte y desinfección final de granja.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Diluir 2-4 mL de GLUTALTEK 2/3 por litro de agua.



IODO POVIDONA
5 L

COMPOSICIÓN: Povidona iodo 10 g, Lauril sulfato de sodio 0.5 g., Fosfato trisódico c.s.p. pH 5.5 0.6 g. Excipientes, c.s.p. 100 ml.

INDICACIONES: Posee actividad bactericida, fungicida, viricida, protozoocida. Es utilizado en la industria avícola, frigoríficos, industria lechera, instrumental quirúrgico, ganadería.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:
- Desinfección de galpones, pisos, corrales: 50 ml en 10 lts. de agua.
- Desinfección de mesas, piletas, bebederos: 10 ml en 10 lts. de agua.
- Desinfección de agua de bebida (uso interno): 5 ml en 10 lts. de agua.
- Desinfección de manos del personal, heridas en animales: 5 a 10 ml cada 10 lts.
- Desinfección de incubadoras, nacedoras, etc.: 30 a 50 ml en 10 lts. de agua. Para la prevención de la difusión de enfermedades infectocontagiosas 10 ml en 15 lts. de agua.